

ACCUEIL CLINIQUE
ORDONNANCE INDIVIDUELLE STANDARDISÉE

Nom _____ RAMQ _____

Artérite temporale

- La personne référée répond aux critères universels d'admissibilité à l'accueil clinique et ne présente aucune des contre-indications spécifiques à la situation clinique visée par la présente référence.

Préciser la suspicion clinique d'artérite temporale (un seul choix) personne refusée à l'accueil clinique si non complété

- Modérée ou élevée faible

Renseignements cliniques : _____

ATCD pertinents: _____

Allergies : _____

Prélèvement sanguin (à faire à l'Accueil clinique dans les 24h) :

- FSC - Glycémie - Créat - Na- K - β hCG (Femme en âge de procréer) - protéine C réactive – VS – INR - PTT

Si suspicion clinique modérée ou élevée :

- Donner 1 dose de prednisone 60 mg po (à l'accueil clinique) ; puis 60 mg po die X 48 heures

Si suspicion clinique faible :

- Ne pas donner de prednisone

Consultation en médecine interne :

- Du lundi au vendredi midi : le jour même à 13h30
→ Du vendredi PM au dimanche : lundi à 9h

Informations générales

Signature : _____ Date (aaaa-mm-jj) : _____ Heure : _____

Nom du médecin référent : _____ Numéro de pratique : _____

Suivi médical assuré par médecin référent : _____ ou par Dr : _____

Téléphone : _____ Télécopieur : _____

Clinique/UMF/GMF : _____

Communiquer avec l'infirmière de l'accueil clinique au numéro : 514 338 - 3125

Fax : 514 338 - 3895

ACCUEIL CLINIQUE

**ORDONNANCE MÉDICALE POUR
PHARMACIE COMMUNAUTAIRE**

NOM _____

Artérite temporale

ORDONNANCE À REMETTRE AU PATIENT

SEULEMENT SI SUSPICION CLINIQUE D'ARTÉRITE TEMPORALE MODÉRÉE OU ÉLEVÉE

Poids : _____

Allergie : _____

Prednisone 60 mg 1 co. PO, DIE pour 3 doses (3 jours)_ NR

(sera réévalué lors de la consultation en médecine interne)

Autre : _____

Signature du médecin : _____

Nom du médecin référent : _____ Numéro de permis : _____

Date : _____ Heure : _____

Téléphone : _____ Télécopieur : _____

Accueil Clinique

Votre problème de santé est évalué comme semi urgent par le médecin. Il a besoin pour confirmer son diagnostic, d'examen radiologiques ou d'une consultation par un médecin spécialiste. Il vous réfère à l'accueil clinique de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal où une infirmière organisera pour vous, les soins et services dont vous avez besoin. Avant de quitter le bureau, le médecin avisera l'infirmière de l'Accueil Clinique de votre arrivée à l'hôpital. **L'infirmière peut retarder votre visite à l'hôpital et décider de vous fixer un rendez-vous.**

Assurez-vous qu'il sera facile de vous joindre rapidement entre 8 h et 16 h du lundi au vendredi.

1. Avant de quitter le bureau, le médecin vous remettra :

- Une copie de sa note médicale ;
- Une feuille d'ordonnance médicale ;
- Dans certains cas, une ordonnance pour une pharmacie communautaire.

3. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

5400, boul. Gouin Ouest
Tél. : 514 338-2222, poste 1-7300

Pour se rendre à l'accueil clinique :

- Passer par l'entrée principale aile G sur le boulevard Gouin.
- Prendre l'**ascenseur A-5** qui se trouve à gauche du kiosque d'information et monter au 4^e étage aile C.
- Rendu au 4^e étage, tourner à gauche, vous arriverez dans l'aile C.
- L'accueil clinique se trouve au bout du corridor au **local C-4120**.

Trouver un stationnement :



- Les aires de stationnement à gauche et à droite de l'entrée principale sont réservées aux visiteurs.
- Tarifs de stationnement
 - 0-30 minutes : Gratuites
 - 31-60 minutes : 8 \$
 - 61-90 minutes : 13 \$
 - 91-120 minutes : 16 \$
 - 121-240 minutes : 18 \$
 - 241 minutes et plus : 20 \$

Prix sujet à changement, information disponible sur place.

2. Pour votre visite à l'accueil clinique vous devez :

- Remettre à l'infirmière les documents que le médecin vous a donnés, ils sont absolument nécessaires pour débiter le suivi,
- Avoir une liste à jour de vos médicaments,
- Avoir votre carte d'assurance maladie RAMQ,
- Apporter votre carte de l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal si vous l'avez.

4. L'accueil clinique se trouve au 4^e étage, au bout du corridor de l'aile C.



**LES SERVICES DE L'ACCUEIL CLINIQUE SONT OFFERTS
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8 H À 16 H,
SAUF LES JOURS FÉRIÉS**

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Nord-de-
l'Île-de-Montréal

Québec



(Version Française)

ARTÉRITE À CELLULES GÉANTES (TEMPORALE)

Votre médecin suspecte une artérite temporale. Une consultation urgente avec un spécialiste a été demandée.

Prévoir une durée entre 4-6 heures pour le rendez-vous car plusieurs évaluations et tests pourraient être nécessaires.

.....

L'artérite à cellules géantes ou artérite temporale est une affection liée à une inflammation des parois des artères qui provoque un gonflement à l'intérieur des artères. Cela peut couper l'approvisionnement de sang aux organes et aux tissus dans le corps. Les artères affectées se situent généralement autour de la tête et du cou, surtout dans la région des tempes (d'où le surnom « artérite temporale »).

L'artérite à cellules géantes appartient à une catégorie de maladies arthritiques appelée vascularite. Le mot vascularite signifie l'inflammation des vaisseaux sanguins.

Il est très important que l'artérite à cellules géantes soit traitée aussi rapidement et aussi agressivement que possible afin d'éviter d'endommager les artères et de s'assurer que les organes et les tissus importants ne soient pas coupés de leur alimentation en sang. Si la maladie n'est pas traitée, elle peut entraîner des complications graves telles des problèmes de cécité (perte de vision) ou un accident vasculaire cérébral (AVC).

Les personnes de 70 ans et + sont les plus atteintes d'artérite à cellules géantes. L'affection peut aussi toucher les patients de 40-60 ans. Elle touche plus fréquemment les femmes que les hommes.

On associe parfois l'artérite à cellules géantes à une autre maladie rhumatismale qui s'appelle la polymyalgia rheumatica. Près de la moitié des personnes atteintes d'artérite à cellules géantes sont également atteintes de polymyalgia rheumatica.

Pour plus d'information, visiter :
vasculitemontreal.com



(English Version)

GIANT CELL ARTERITIS

Your doctor suspects a Giant Cell Arteritis. An urgent consultation with a specialist has been requested.

Plan a duration of 4 -6 hours for the appointment as many evaluations and tests might be required.

.....

Giant Cell Arteritis (GCA), also known as temporal arteritis, is a condition where inflammation of the lining of the arteries causes swelling of the arteries. This can cut off the blood supply to organs and tissues in the body. The most common arteries affected are around the head and neck, especially the area around the temples (i.e. temporal arteritis).

GCA belongs to a family of diseases called vasculitis. The word vasculitis means inflammation of blood vessels.

It is very important that GCA is treated as early and aggressively as possible to reduce damage to the arteries and ensure that important organs and tissues in the body are not cut off from their blood supply. If left untreated, the disease can lead to serious complications including blindness and stroke.

People aged 70 and older are most commonly affected by GCA. The condition can also occur in people in their 40s to 60's. It is about twice as common in women than men.

GCA is sometimes associated with another rheumatic disease called polymyalgia rheumatica (PMR). About half of the people who have giant cell arteritis also have PMR.

For more information, please visit:
vasculitismontreal.com