



**ACCUEIL CLINIQUE**  
**ORDONNANCE INDIVIDUELLE STANDARDISÉE**

Nom \_\_\_\_\_ RAMQ \_\_\_\_\_

**Diverticulite**

La personne référée répond aux critères universels d'admissibilité à l'accueil clinique et ne présente aucune des contre-indications spécifiques à la situation clinique visée par la présente référence

Renseignements cliniques : \_\_\_\_\_

ATCD pertinents : \_\_\_\_\_

Allergies : \_\_\_\_\_

**Ordonnances médicales**

Poids : \_\_\_\_\_

**Prélèvement sanguin ≤ 24 heures**

- FSC - Glycémie - Urée - E+ - Créatinine - ALT - Bilirubine - Lipase - B-HCG (♀ en âge de procréer)

**Épreuves diagnostiques :**

- Scan abdomino-pelvien délai < 24 heures.
- Scan C - si allergie aux produits de contraste iodés ou si Clcr < 60 mL/min ou si créatinine > 130 µmol/L

Selon les résultats du Scan abdomino-pelvien ou du Scan C –

- Si diverticule compliquée (abcès, perforation, fistule,...) → diriger la personne vers l'urgence.
- Si scan négatif ou autre trouvaille, retour au médecin référent. Cesser antibiotique si débuté.
- Si diverticulite simple (pour toutes les personnes, quelque soit l'âge)
  - débuter médication selon l'ordonnance médicale pour pharmacie communautaire remise à la personne référée :
    - ciprofloxacine pour 10 jours au total
    - metronidazole pour 10 jours au total
  - Si allergie aux quinolones ou au métronidazole
    - amoxicilline+clavulanate (Clavulin®) pour 10 jours au total
  - référer en nutrition clinique (externe) plus conseils
  - selon l'âge :
    - ≤ 40 ans : coloscopie virtuelle → délai < 3-4 mois
    - 40–50 ans sans antécédent familial : coloscopie virtuelle → délai < 3-4 mois

**Consultation en gastro-entérologie** (en plus des mesures précédentes : médication, nutrition clinique, conseils).

- ≥ 50 ans → délai < 2 mois
- 40 – 50 ans avec antécédents familiaux (polype du colon, néo) → délai < 2 mois

**Informations générales**

Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_

Nom du médecin référent : \_\_\_\_\_ Numéro de pratique : \_\_\_\_\_

Suivi médical assuré par médecin référent \_\_\_\_\_ ou par Dr : \_\_\_\_\_

Clinique/UMF/GMF : \_\_\_\_\_ Téléphone : \_\_\_\_\_ Télécopieur : \_\_\_\_\_

**Communiquer avec l'infirmière de l'accueil clinique au numéro : 514 338 - 3125**

**Fax : 514 338 - 3895**



ACCUEIL CLINIQUE

ORDONNANCE MÉDICALE POUR  
PHARMACIE COMMUNAUTAIRE

NOM : \_\_\_\_\_

Diverticulite

Allergie : \_\_\_\_\_

PARTIE 1

Ordonnance à remplir si prise en charge le lendemain **SEULEMENT**

Antibiothérapie

- ciprofloxacine 500 mg PO, BID pour 3 doses (diminuer la dose à 250 mg PO, BID si Clcr < que 30 mL/min.) **NR**
- metronidazole 500 mg PO, TID pour 5 doses **NR**

Si allergie aux quinolones ou au métronidazole

- amoxicilline+clavulanate (Clavulin®) 875/125 mg PO, BID pour 3 doses (diminuer la dose à 500/125 mg PO, BID si Clcr < que 30 mL/min) **NR**

PARTIE 2

Ordonnance à compléter par le médecin **EN TOUT TEMPS.**

Médication à prendre après avoir rencontré l'infirmière de l'accueil clinique et selon le résultat du scan abdomino-pelvien.

Antibiothérapie

- ciprofloxacine 500 mg PO, BID pour 10 jours total (diminuer la dose à 250 mg PO, BID si Clcr < que 30 mL/min.) **NR**
- metronidazole 500 mg PO, TID pour 10 jours total **NR**

Si allergie aux quinolones ou au métronidazole

- amoxicilline+clavulanate (Clavulin®) 875/125 mg PO, BID pour 10 jours (diminuer la dose à 500/125 mg PO, BID si Clcr < que 30 mL/min) **NR**

Analgésique PRN

- \_\_\_\_\_

Signature du médecin \_\_\_\_\_

Nom du médecin référent : \_\_\_\_\_ Numéro de permis : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ Télécopieur : \_\_\_\_\_

# Accueil Clinique

Votre problème de santé est évalué comme semi urgent par le médecin. Il a besoin pour confirmer son diagnostic, d'examen radiologiques ou d'une consultation par un médecin spécialiste. Il vous réfère à l'accueil clinique de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal où une infirmière organisera pour vous, les soins et services dont vous avez besoin. Avant de quitter le bureau, le médecin avisera l'infirmière de l'Accueil Clinique de votre arrivée à l'hôpital. **L'infirmière peut retarder votre visite à l'hôpital et décider de vous fixer un rendez-vous.**

**Assurez-vous qu'il sera facile de vous joindre rapidement entre 8 h et 16 h du lundi au vendredi.**

## 1. Avant de quitter le bureau, le médecin vous remettra :

- Une copie de sa note médicale ;
- Une feuille d'ordonnance médicale ;
- Dans certains cas, une ordonnance pour une pharmacie communautaire.

## 3. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

5400, boul. Gouin Ouest  
Tél. : 514 338-2222, poste 1-7300

### Pour se rendre à l'accueil clinique :

- Passer par l'entrée principale aile G sur le boulevard Gouin.
- Prendre l'**ascenseur A-5** qui se trouve à gauche du kiosque d'information et monter au 4<sup>e</sup> étage aile C.
- Rendu au 4<sup>e</sup> étage, tourner à gauche, vous arriverez dans l'aile C.
- L'accueil clinique se trouve au bout du corridor au **local C-4120**.

### Trouver un stationnement :



- Les aires de stationnement à gauche et à droite de l'entrée principale sont réservées aux visiteurs.
- Tarifs de stationnement
  - 0-30 minutes : Gratuites
  - 31-60 minutes : 8 \$
  - 61-90 minutes : 13 \$
  - 91-120 minutes : 16 \$
  - 121-240 minutes : 18 \$
  - 241 minutes et plus : 20 \$

*Prix sujet à changement, information disponible sur place.*

## 2. Pour votre visite à l'accueil clinique vous devez :

- Remettre à l'infirmière les documents que le médecin vous a donnés, ils sont absolument nécessaires pour débiter le suivi,
- Avoir une liste à jour de vos médicaments,
- Avoir votre carte d'assurance maladie RAMQ,
- Apporter votre carte de l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal si vous l'avez.

## 4. L'accueil clinique se trouve au 4<sup>e</sup> étage, au bout du corridor de l'aile C.



**LES SERVICES DE L'ACCUEIL CLINIQUE SONT OFFERTS  
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8 H À 16 H,  
SAUF LES JOURS FÉRIÉS**

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Nord-de-  
l'Île-de-Montréal

Québec